

# Mathématiques

## Enseignement Scientifique

### Arbres Pondérés



**CORRIGÉ** DE L'EXERCICE

# LE VIRUS

## CORRECTION

1. Reproduisons et complétons l'arbre de probabilités:

D'après l'énoncé, nous avons:

- $S_n$  = " l'individu est de type S en semaine n ".
- $M_n$  = " l'individu est malade en semaine n ".
- $I_n$  = " l'individu est immunisé en semaine n ".

- $P(S_0) = 1$
- $P(M_0) = 0$
- $P(I_0) = 0$

(  $1 + 0 + 0 = 1$  ).

- $P_{S_0}(S_1) = 85\%$
- $P_{S_0}(M_1) = 1 - 85\% - 10\% = 5\%$
- $P_{S_0}(I_1) = 10\%$

(  $85\% + 5\% + 10\% = 1$  ).

- $P_{S_1}(S_2) = 85\%$
- $P_{S_1}(M_2) = 5\%$
- $P_{S_1}(I_2) = 10\%$


(  $85\% + 5\% + 10\% = 1$  ).

- $P_{M_1}(M_2) = 65\%$
- $P_{M_1}(I_2) = 35\%$
- ( $65\% + 35\% = 1$ ).

- $P_{I_1}(I_2) = 1$ .

D'où l'arbre de probabilités suivant:

Freemaths: Tous droits réservés



- , avec:
- $a = 85\%$
  - $b = 5\%$
  - $c = 10\%$
  - $d = 65\%$
  - $e = 35\%$
  - $f = 1$

2. Montrons que  $P(I_2) = 0,2025$ :

Nous devons ainsi calculer:  $P(I_2)$ .

Or, l'événement  $I_2 = (I_2 \cap S_1) \cup (I_2 \cap M_1) \cup (I_2 \cap I_1)$ .

D'où:  $P(I_2) = P(I_2 \cap S_1) + P(I_2 \cap M_1) + P(I_2 \cap I_1)$

$$= P_{S_1}(I_2) \times P(S_1) + P_{M_1}(I_2) \times P(M_1) + P_{I_1}(I_2) \times P(I_1).$$

Ainsi:  $P(I_2) = 0,2025$ .

Au total:  $P(I_2) = 20,25\%$ .

3. Déterminons la probabilité qu'un individu ait été malade en semaine 1, sachant qu'il est immunisé en semaine 2:

Cela revient à calculer:  $P_{I_2}(M_1)$ .

$$P_{I_2}(M_1) = \frac{P(I_2 \cap M_1)}{P(I_2)}$$

$$= \frac{P_{M_1}(I_2) \times P(M_1)}{P(I_2)}$$

Ainsi:  $P_{I_2}(M_1) \approx 0,086$ .

Au total, la probabilité qu'un individu ait été malade en semaine 1, sachant qu'il est immunisé en semaine 2 est d'environ:  $8,6\%$ .